

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–25 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

imidakloprido	100 mg,
permetrino	500 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (E321)	1 mg.
-----------------------------	-------

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.
Šviesiai gelsvas ar rusvas tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), gydyti ir profilaktiškai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo.

Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis 4 savaites.

Vaistą galima naudoti šunims, sergantiems blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis *Dermacentor reticulatus* 3 sav., *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus* – 4 sav.

Praėjus 2 dienoms po gydymo, erkės gali nežūti, o prisitvirtinti ir būti matomos. Jų sunaikinimui rekomenduotinas pakartotinis gydymas.

Vienas gydymas apsaugo nuo smėlinių blusų *Phlebotomus papatasi* 2 sav., *Phlebotomus perniciosus* – 3 sav., nuo uodų *Aedes aegypti* – 2 sav., *Culex pipiens* – 4 sav., nuo arklinių blusų *Stomoxys calcitrans* – 4 sav.

Smėlinės blusos	<i>Phlebotomus perniciosus</i>	3 savaitės
	<i>Phlebotomus papatasi</i>	2 savaitės
Uodai	<i>Aedes aegypti</i>	2 savaitės
	<i>Culex pipiens</i>	4 savaitės
Arklinės blusos	<i>Stomoxys calcitrans</i>	4 savaitės

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus.

Negalima naudoti katėms.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, viena kita erkė gali prisitvirtinti, uodas ar smėlio blusa gali įgelti.

Dėl šios priežasties infekcinių ligų pernešimo per šiuos parazitus galimybė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka. Kita vertus, veterinarinis vaistas pasižymi erkės, smėlio blusas ir uodus atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu, todėl užsikrėtimo kraujasiurblių ektoparazitų pernešamomis ligomis (borelioze, riketsioze, erlichioze ar leišmanioze) rizika sumažėja.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo ar kito gyvūno akis ir (ar) burną.

Vaistą skirti kaip nurodyta 4.9 p.

Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vienas kito.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžiūs vaisto užlašinimo vieta.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokių būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telikinių.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją bei parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

Būtina vengti liesti gydytą gyvūną, kol neišdžiuvusi vaisto užlašinimo vieta.

Negalima leisti vaikams liesti gydyto gyvūno, kol neišdžiuvusi preparato užlašinimo vieta.

Rekomenduotina veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais.

Kitos atsargumo priemonės

ADVANTIX sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retais atvejais šunims gali pasireikšti laikini odos sudirginimo požymiai (niežėjimas, paraudimas) ar mieguistumas.

Jei gydytas gyvūnas nulaižo vaisto užlašinimo vietą, nedažnai galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius – drebulį ir mieguistumą. Taikomas simptominis gydymas.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Rekomenduotina mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio. Skirtingo svorio šunims rekomenduotinos tokios preparato dozės:

Šuns svoris	Vaisto pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg)	Permetrino dozė (mg/kg)
≤ 4 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio	0.4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
>4 kg ≤ 10 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims	1.0	10 – 25	50 – 125
>10 kg ≤ 25 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–5 kg svorio šunims	2.5	10 – 25	50 – 125
>25 kg ≤ 40 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims	4.0	10 – 16	50 – 80

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 40 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio tūbeles.

Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduotina gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką.

Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ektoparazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduotina maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Vaistas skirtas išoriniam naudojimui.

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Apvertus, dangtelį vėl užsukti ant tūbelės, pažeidžiant tūbelės sandarumą, kaip parodyta paveiksle.



Šunims iki 10 kg svorio:

Praskyrus plaukus srityje tarp menčių, tūbelės turinį reikia išspausti tiesiogiai ant odos vienoje vietoje. Priglausti tūbelės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį.

Negalima vaisto lašinti ant šuns kailio paviršiaus.

Naudoti galima tik ant sveikos odos.



Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg:

Tūbelės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje turi matytis oda.

Priglaudus tūbelės galiuką prie odos, atsargiai išspausti dalį tirpalo ant odos.

Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Naudojus 5 kartus didesnes nei rekomenduotina dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, kurių motinos buvo gydytos 3 kartus didesnėmis dozėmis, nepalankių reiškinių nepastebėta.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui, iskaitant insekticidus.
ATCvet kodas: QP53AC54.

ADVANTIX užlašinamajame tirpale yra dvi veikliosios medžiagos – imidakloprodas ir permetrinas. Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Imidaklopridas (chloronikotinilo nitroguanidinas) – ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloro nikotinilo junginių grupei, veikianti tiek suaugusias blusas, tiek jų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su gydytu gyvūnu. Imidaklopridas pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės

nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetylcholino receptoriams. Dėl cholinerginio nervinių impulsų perdavimo slopinimo sukeliamas vabzdžių paralyžius ir žūtis. Permetrinas yra I tipo sintetinis piretroidas – insekticidinė medžiaga. Veikdamas parazitų nervinių ląstelių natrio jonų kanalus, sukelia nervų sistemos perdirginimą ir parazito paralyžių bei žūtį. Imidaklopridas ir permetrinas veikia sinergistiškai, nes vienu metu dirginami ir neuronai (permetrinas), ir nerviniai ganglijai (imidaklopridas).

5.2. Farmakokinetinės savybės

Tirpalas, skirtas išoriniam naudojimui ant odos, užlašintas greitai pasiskirsto gyvūno kūno paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos išlieka efektyvios ant plaukų ir odos 4 savaites. Odos tyrimais su žiurkėmis ir šunimis, taip pat perdozavimo ir serumo kinetiniais tyrimais nustatyta, kad veikliųjų medžiagų sisteminė absorbcija yra menka, laikina ir klinikiniam efektyvumui įtakos neturi.

Savybės aplinkoje

Veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens gyvūnams.
Permetrinas toksiškas bitėms.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

N-metilpirolidonas, migliolis 812, citrinų rūgštis, butilhidroksitoluenas (E321).

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalaus aliuminio folijos pakelio – 5 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, pažeidus originalų aliuminio folijos pakelį – 24 mėn.
Atidarius pirminę pakuotę, veterinarinį vaistą būtina sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Negalima sušaldyti.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Baltos polipropileninės tūbelės po 0,4, 1, 2,5 ir 4 ml su polipropilininiais dangteliais, polichlorotrifluoroetileno/polivinilchlorido lizduotėse po 4 vnt., aliuminio folijos pakeliuose, kartoninėse dėžutėse.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

6. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

LT/2/04/1608/001-004

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2009-02-13

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-09-02

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–125 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

imidakloprido	100 mg,
permetrino	500 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 0,4 ml
4 x 1,0 ml
4 x 2,5 ml
4 x 4,0 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys

6. INDIKACIJOS

- Naikina erkes ir blusas.
- Atbaido erkes, uodus, smėlines ir arklines blusas.
- Naikina blusas (gydymui ir profilaktikai), tinka naudoti esant blusų sukeltam alerginiam dermatitui.
- Naikina ir atbaido erkes; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamomis ligomis (borelioze, riketsioze, erlichioze) riziką.
- Atbaido uodus ir smėlines blusas; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamomis ligomis (leišmanioze) riziką.
- Atbaido arklines blusas; apsaugo nuo įkandimų dermatito.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Pažeidus originalų folijos pakelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko, jei jis trumpesnis.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, aliuminio folijos pakelyje, kartoninėje dėžutėje.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/04/1608/001

LT/2/04/1608/002

LT/2/04/1608/003

LT/2/04/1608/004

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr./Lot

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 40 mg	Permethrin 200 mg
Imidacloprid 100 mg	Permethrin 500 mg
Imidacloprid 250 mg	Permethrin 1250 mg
Imidacloprid 400 mg	Permethrin 2000 mg

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml
1 ml
2,5 ml
4 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Spot on

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

LOT

7. TINKAMUMO DATA

EXP

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us.vet.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ

ALUMINIO FOLIJOS PAKELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix spot on ≤ 4 kg

Advantix spot on > 4 kg ≤ 10 kg

Advantix spot on > 10 kg ≤ 25 kg

Advantix spot on > 25 kg ≤ 40 kg

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

EXP

Pažeidus originalų folijos pakelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko (EXP), jei jis trumpesnis.

4. SERIJOS NUMERIS

LOT

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix spot on ≤ 4 kg
Advantix spot on > 4 kg ≤ 10 kg
Advantix spot on > 10 kg ≤ 25 kg
Advantix spot on > 25 kg ≤ 40 kg

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

LOT

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

INFORMACINIS LAPELIS

ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–25 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–25 kg svorio šunims
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

imidakloprido 100 mg,
permetrino 500 mg;

pagalbinių medžiagų:

butilhidroksitolueno (E321) 1 mg.

Preparato pavadinimas	Tūbelė	Imidakloprido	Permetrino	Butilhidroksitolueno (E321)
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg šunims	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–25 kg šunims	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg šunims	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 40 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio tūbeles.

4. INDIKACIJOS

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), gydyti ir profilaktiškai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo.

Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis 4 savaites.

Vaistą galima naudoti šunims, sergantiems blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis *Dermacentor reticulatus* 3 sav., *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus* – 4 sav.

Praėjus 2 dienoms po gydymo, erkės gali nežūti, o prisitvirtinti ir būti matomos. Jų sunaikinimui rekomenduotinas pakartotinis gydymas.

Vienas gydymas apsaugo nuo smėlinių blusų *Phlebotomus papatasi* 2 sav., *Phlebotomus perniciosus* – 3 sav., nuo uodų *Aedes aegypti* – 2 sav., *Culex pipiens* – 4 sav., nuo arklinių blusų *Stomoxys calcitrans* – 4 sav.

Smėlinės blusos	<i>Phlebotomus perniciosus</i>	3 savaitės
	<i>Phlebotomus papatasi</i>	2 savaitės
Uodai	<i>Aedes aegypti</i>	2 savaitės
	<i>Culex pipiens</i>	4 savaitės
Arklinės blusos	<i>Stomoxys calcitrans</i>	4 savaitės

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaitių amžiaus.

Negalima naudoti katėms.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais šunims gali pasireikšti laikini odos sudirginimo požymiai (niežėjimas, paraudimas) ar mieguistumas. Jei gydytas gyvūnas nulaižo vaisto užlašinimo vietą, nedažnai galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius – drebulį ir mieguistumą. Taikomas simptominis gydymas.

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduotina mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio. Skirtingo svorio šunims rekomenduotinos tokios preparato dozės:


Šuns svoris	Preparato pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg)	Permetrino dozė (mg/kg)
≤ 4 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas šunims iki 4 kg svorio	0.4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
>4 kg ≤ 10 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 4–10 kg svorio šunims	1.0	10 – 25	50 – 125
>10 kg ≤ 25 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 10–25 kg svorio šunims	2.5	10 – 25	50 – 125
>25 kg ≤ 40 kg	ADVANTIX, užlašinamasis tirpalas 25–40 kg svorio šunims	4.0	10 – 16	50 – 80

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 40 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio tūbelės.

Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduotina gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką. Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ektoparazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduotina maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Vaistas skirtas išoriniam naudojimui.

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Apvertus, dangtelį vėl užsukti ant tūbelės, pažeidžiant tūbelės sandarumą, kaip parodyta paveiksle.



Šunims iki 10 kg svorio:

Praskyrus plaukus srityje tarp menčių, tūbelės turinį reikia išspausti tiesiogiai ant odos vienoje vietoje. Priglausti tūbelės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį. Negalima vaisto lašinti ant šuns kailio paviršiaus. Naudoti galima tik ant nepažeistos odos.



Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg:

Tūbelės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje turi matytis oda.

Priglaudus tūbelės galiuką prie odos, atsargiai išpausti dalį tirpalo ant odos.

Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Išoriniam naudojimui.

Naudoti tik ant sveikos odos.

Negalima naudoti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, kad tirpalas nenuvarvėtų šuniui per šonus.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima sušaldyti.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

Tinkamumo laikas, pažeidus originalų aliuminio folijos pakelį – 24 mėn.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo ar kito gyvūno akis ir (ar) burną.

Vaistą skirti kaip nurodyta 4.9 p.

Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vienas kito.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokia būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telikinių.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją bei parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

Būtina vengti liesti gydytą gyvūną, kol neišdžiuvusi vaisto užlašavimo vieta. Negalima leisti vaikams liesti gydyto gyvūno, kol neišdžiuvusi preparato užlašavimo vieta. Todėl rekomenduotina veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2009-09-02

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui, iskaitant insekticidus.
ATCvet kodas: QP53AC54.

ADVANTIX užlašinamajame tirpale yra dvi veikliosios medžiagos – imidakloprodas ir permetrinas. Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūva po sąlyčio su gydytu gyvūnu.

ADVANTIX sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašavimo vieta turi išdžiūti.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.